

« Journée nationale de lutte contre les hépatites virales »

Colloque national


Mardi 15 Mai 2018. Ministère des Solidarités et de la Santé

Recommandations



pour l'élimination de l'infection par le VHC en France

Nombre de décès dans le monde entre 2000 et 2016



Epidémie en France

120 000 patients restent à traiter

Plus de la moitié ne sont pas dépistés

7ème cause de décès dans le monde en 2013
47 % liés au virus B et 48 % liés au virus C

Introduction

Les recommandations AFEF publiées en mars 2018
visent à obtenir le plus rapidement possible
l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C
en France avant 2025

Objectif : élimination de l'infection par le VHC

Envisageable


Méthodes diagnostiques simples

Traitements efficaces

A condition d'intensifier

les politiques de dépistage

et d'ouverture au traitement




Le parcours simplifié : pourquoi ?

- ✓ Aller vers les patients
- ✓ Renforcer le lien de proximité avec le médecin traitant, le pharmacien...
- ✓ Adapter la prise en charge à chacun
- ✓ Traiter au bon moment

A quelle condition ? Pas de « perte de chance » pour le patient

Le parcours simplifié


ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE



Tutoriel :  YouTube – ame afef

* Co-infection VHB VIH, insuffisance rénale sévère Comorbidités (consommation d'alcool à risque, diabète, obésité) mal contrôlées

Parcours simplifié



Parcours simplifié

Sérologie VHC positive

Charge virale VHC


Détectable

Antécédent de traitement de l'hépatite C
Co-infection VHB VIH, insuffisance rénale sévère
Comorbidités (consommation d'alcool à risque, diabète, obésité) mal contrôlées

OUI

Prise en charge spécialisée


Parcours simplifié




Evaluation de la maladie hépatique

- ✓ Indiquer sur l'ordonnance « hépatite chronique C non traitée »
- ✓ Soit mesure de l'élasticité hépatique par Fibroscan®
- ✓ Soit un bilan sanguin
 - Fibrotest®
 - Fibromètre®

Parcours simplifié



Parcours simplifié



Avant de débuter le traitement : bilan initial

- ✓ NFS plaquettes
- ✓ Bilan hépatique : ASAT, ALAT, GGT, bilirubine
- ✓ Débit de filtration glomérulaire
- ✓ Bilan viral : antigène HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc, sérologie VIH
- ✓ Vérifier que la charge virale du VHC est bien détectable

Avant de débuter le traitement

- ✓ Rechercher d'éventuelles interactions médicamenteuses
(www.hep-druginteractions.org ou application smartphone HEP iChart)
- ✓ Enquêter sur l'automédication et sur la médecine naturelle (millepertuis, compléments alimentaires...)
- ✓ S'assurer de l'absence de consommation de pamplemousse ou d'orange sanguine pendant le traitement
- ✓ Insister sur la nécessité d'une observance optimale au traitement

Traitement

Ecrire sur une ordonnance


✓ Epclusa[®] 1 cp par jour pendant 12 semaines

OU

✓ Maviret[®] 3 cp par jour en une prise, avec de la nourriture, pendant 8 semaines

Après le traitement

Charge virale du VHC 12 semaines après l'arrêt du traitement



Recommandations AFEF

- ✓ Le dépistage de chaque adulte au moins une fois dans sa vie est recommandé
- ✓ Le dépistage du VHB, du VHC et du VIH doit être combiné
- ✓ Tous les tests de dépistage doivent être remboursés à 100% par la sécurité sociale



Pr Ariane Mallat (APHP Henri Mondor)

Pr Christophe Bureau (CHU Toulouse)

Dr Hélène Fontaine (APHP Cochin)

Dr Bertrand Hanslik (Montpellier)

Pr Christophe Hézode (APHP Henri Mondor)

Pr Victor de Lédinghen (CHU Bordeaux)

Pr Georges-Philippe Pageaux (CHU Montpellier)

Dr André-Jean Rémy (CH Perpignan)

Pr Dominique Salmon (APHP Cochin)

Pr Albert Tran (CHU Nice)

Dr Pascale Trimoulet (CHU Bordeaux)

Comité de relecture

Dr Christophe Flatet

Dr Jean-Yves Liotier

Dr Annie Mignard

Mme Bénédicte Vauban Fradique

Mme Nara Stefanelli

Pour en savoir plus...



**RECOMMANDATIONS AFEF
POUR L'ÉLIMINATION DE L'INFECTION
PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C
EN FRANCE**



Mars 2018
Avec le soutien de la SPILF
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française)

WWW.AFEF.ASSO.FR

Elargissement des prescripteurs

- ✓ Allemagne et Australie
- ✓ Augmentation significative du nombre de patients traités

