

# DEPISTAGE AUDITIF

CLINIQUE MATHILDE

10/03/15

# Sommaire

- \* Mise en place du projet
- \* Formation
- \* Information / Réalisation
- \* Traçabilité

# Dépistage Auditif : Mise en Place

- \* Engagement contractuel avec ARS Haute Normandie en septembre 2008. Dépistage opérationnel en janvier 2009.
- \* Choix du matériel : identique à celui de tous les établissements de la région (ORL CHU responsable projet)
- \* ORL de la clinique sont centre de référence

# Dépistage Auditif : Mise en place

- \* Annonce du projet aux différentes équipes / information sur la surdité, le dépistage, la prise en charge.
  - Réunion avec les ORL, les pédiatres, la direction
  - Réunion avec les équipes de Maternité

# Dépistage Auditif : Formation

- \* Le personnel formé est composé de Puéricultrices, Auxiliaires de puériculture et sages-femmes
- \* Réunion information (2h )
- \* Formation technique des testeurs à l'utilisation du matériel, réalisation du test mais aussi à l'annonce des résultats ( ½ journée)

# Dépistage Auditif : Information des Parents

- \* Evoqué dans le livret d'accueil
- \* Remise en main propre d'un document écrit, personnalisé en même temps que celui du dépistage sanguin néonatal
- \* Information orale par le testeur au moment de la réalisation du test

# Dépistage Auditif : Type de Tests

- \* Protocoles établis, réalisation à J3
- \* OEAA en première intention puis PEAA si besoin
- \* PEAA en néonatalogie
- \* Le pédiatre donne le résultat du test à la visite de sortie, mais le personnel qui réalise le test en présence de la mère tranquillise la mère au moins quand le test est positif et se doit d'être rassurant quand le test est négatif.

# Dépistage Auditif : Traçabilité

- \* Journalière : dans un cahier avec coordonnées du nouveau né , type de test réalisé et résultats pour chaque oreille mais aussi dans le carnet de santé avec tampon
- \* Hebdomadaire: qui reprend tous les dépistages, les transferts de nouveau né ....
- \* Reconvocation : RDV fixé avec le secrétariat des ORL, avant la sortie de maternité, 3 sem plus tard.