


Les **précautions Standard** sont systématiquement à respecter :

- ✓ *Par **tous** les soignants*
- ✓ *Pour **tout** patient (quel que soit son statut infectieux)*

La plus **simple**
et la plus **efficace**
des précautions

I'HYGIENE DES MAINS



NB : Dans certaines situations, des **précautions complémentaires** pourront être mises en œuvre, **en plus des précautions Standard.**

Plaquette réalisée sous l'égide du CLIN

(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)



Bibliographie

- Circulaire n° 98-249 du 20 avril 1998
- "100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales", CTIN 1999
- Guide Technique d'Hygiène Hospitalière, CCLIN Sud Est, 2004

Avec l'aimable autorisation de Mme Hum du CLIN d'Annecy pour les dessins.

Document réalisé en
Mai **2006**

Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière

EOHH du Centre Hospitalier InterCommunal des Alpes du Sud



PRECAUTIONS STANDARD

6 précautions générales

Permettent d'éviter la **transmission croisée de micro-organismes** :

de patient à patient,

de patient à soignant,

de soignant à patient.

Assurent **VOTRE** sécurité
et
celle des **PATIENTS**

HYGIENE DES MAINS

Entre 2 patients
Entre 2 activités
Après le retrait des gants



Mains ni souillées, ni mouillées, ni poudrées

Friction avec un produit hydro-alcoolique



Mains souillées

Lavage des mains au savon

PORT DE GANTS

1 paire - 1 geste - 1 patient

En cas de risque

de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses, une peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets

Lors des soins à risque de piqûre ou de coupure

Si les mains présentent des lésions



TENUE DE PROTECTION

- Surblouse
- Masque et lunettes

Porter surblouse, masque et lunettes

Lors d'exposition à un risque de projection de sang ou de liquide biologique

Porter la surblouse ou un tablier seul

Lors d'un soin contaminant ou exposant à un contact large avec un patient



MATERIELS ET SURFACES SOUILLES

Eliminer

immédiatement après le geste, tout objet piquant ou tranchant, dans le collecteur adapté, au plus près du soin



Manipuler avec précaution le matériel réutilisable souillé

Traiter le matériel avec la procédure adaptée et s'en assurer

Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées par du sang ou des liquides biologiques

TRANSPORT

De prélèvements biologiques
Du linge souillé
Du matériel souillé

Utiliser un emballage

Pour renforcer la protection lors du transport de prélèvements biologiques

Dans tous les cas

Les emballages seront **fermés**, étanches, à usage unique, ou, si réutilisables, nettoyés régulièrement



EN CAS D'ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

Immédiatement

Réaliser un lavage et une antiseptie de la plaie

En cas de projection, rincer abondamment (5 min)



Dès que possible, avant 4 heures

Contacter le médecin référent ou le médecin des urgences

Dans les 48 heures, déclaration d'accident

