

Prescription et dispensation du Paxlovid® en ville



Paxlovid est indiqué dans le traitement du COVID-19 chez les patients adultes non oxygéo-réquerant à risque accru d'évolution vers une forme sévère du COVID-19



Posologie - Prise simultanée par voie orale de :
- 300 mg de nirmatrelvir (deux comprimés de 150 mg)
- 100 mg de ritonavir (un comprimé de 100 mg)
Chaque 12 heures pendant 5 jours.

Contre-indications majeures



- Insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)
- Insuffisance rénale sévère (DFG < 30 mL/min)
- Traitement concomitant dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A ou, puissant inducteurs du CYP3A (Liste des interactions contre-indiquées et non recommandées ci-dessous (RCP / [Tableau SFPT](#) - voir QR code)

Interactions médicamenteuses contre-indiquées (RCP) ou non-recommandées (Avis d'experts SFPT)

Traitements angor et insuffisance cardiaque :
Ivabradine, Epléronone, Ranolazine

Antiarythmiques :
Amiodarone, Bépridil, Dronédarone, Encaïnone, Flécaïnone, Propafénone, Quinidine

Antihypertenseur : Bisoprolol
Hypolipémiants : Lomitapide

Anticoagulant : Apixaban, Rivaroxaban

Antiagrégants : Ticagrélor

Antihistaminiques :
Astémizole, Terféndine

Antagonistes α-1 adrénergiques : Alfuzosine
Antigoutteux : Colchicine

Pneumologie : Bosentan, Avanafil, Sildénafil, Vardénafil, Tadalafil (Inhibiteurs PDE5)

Antibiotique : Acide fusidique, Erythromycine

Antituberculeux : Rifampicine, Rifabutine

Antifongique : Voriconazole

Antirétroviraux : Maraviroc, Névirapine, efavirenz, Etravirine

Anti-VHC : Voxaliprevir, Glécaprévir/Pibrentasvir, Méthylérgonovine

Anticancéreux : Nératinib, Apalutamide, Enzalutamide, Vénétoclax

Tractus digestif :
Dompéridone, Naloxegol

Neuroleptiques : Lurasidone, Clozapine, Pimozide, Quétiapine

Dérivés ergot de seigle :
Dihydroergotamine, Ergonovine, Ergotamine

Anxiolytique : Clorazépate, Diazépam, Estazolam, Flurazépam, Midazolam oral, Triazolam, Alprazolam


Anticonvulsivants :
Carbamazépine, Phénobarbital, Phénytoïne

Analgésiques : Péthidine, Piroxicam, Propoxyphène, Fentanyl, Oxycodone

Précautions d'emploi




Interactions médicamenteuses



Paxlovid® contient du ritonavir, inhibiteur enzymatique responsable d'interactions médicamenteuses. L'analyse des interactions est disponible ici : <https://sfpt-fr.org/recospaxlovid> - Voir QR Code



Femmes en âge de procréer / Grossesse




Paxlovid® n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer sans contraception.

Paxlovid® diminue l'efficacité des contraceptifs hormonaux combinés. Utiliser une méthode contraceptive alternative efficace ou une méthode barrière supplémentaire pendant le traitement par Paxlovid, et jusqu'à un cycle menstruel après l'arrêt de Paxlovid.



IR modérée



Les patients présentant une insuffisance rénale modérée doivent prendre **un seul** comprimé de nirmatrelvir 150 mg (rose) et un comprimé de ritonavir 100 mg (blanc).

En présence d'un patient à risque d'évolution vers une forme grave, symptomatique ou diagnostiqué COVID +



Médecin

- Je vérifie l'absence de contre-indication
- J'informe le patient sur le délai d'initiation, la posologie et le cas échéant les précautions d'emploi (voir ci-dessus)
- Je prescris le traitement sur une ordonnance classique en précisant le délai maximal d'initiation (RCP : au plus tard dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes)
- En l'absence de test, je prescris une ordonnance conditionnelle à dispenser sous réserve d'un test positif (Ag ou PCR)
- Je l'oriente vers une pharmacie sans délai et lui indique la nécessité d'apporter ses ordonnances

En amont d'une prescription :

En présence d'un patient symptomatique, je propose de réaliser un test antigénique.

Devant un test positif :

- Je l'informe de l'existence du traitement Paxlovid®
- Je m'assure de l'absence d'interaction médicamenteuse contre-indiquée ([Tableau SFPT](#))
- J'oriente le patient et contacte le médecin de l'éventuelle éligibilité au Paxlovid® sans délai



Pharmacie **En présence d'une prescription :**

- Je m'assure de l'absence d'interaction médicamenteuse contre-indiquée ou nécessitant une adaptation posologique, le cas échéant je préviens le prescripteur.
- J'informe le patient sur le délai d'initiation, la posologie et le cas échéant les précautions d'emploi (voir ci-dessus).
- Je commande une boîte de Paxlovid directement auprès de mon grossiste-répartiteur (outil habituel).