



## Journée de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et promotion de la santé sexuelle

# FF-3S

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE SEXOLOGIE ET DE SANTÉ SEXUELLE

[www.ff3s.fr](http://www.ff3s.fr)

### 14h45 Session 1 : Le cadre conceptuel de la santé sexuelle

*Modérée par Pr François Dabis (HCSP - Haut conseil de la santé publique)*

- Approche médicale en santé sexuelle (Pr Pierre Costa)



# Aucune difficulté sexuelle: Homme et Femme

Age (ans)	HOMMES (%)	FEMMES (%)
<b>18-24</b>	<b>64,7</b>	<b>53,4</b>
<b>25-34</b>	<b>52,6</b>	<b>49,0</b>
<b>35-39</b>	<b>46,9</b>	<b>51,7</b>
<b>40-49</b>	<b>47,9</b>	<b>52,6</b>
<b>50-59</b>	<b>37,3</b>	<b>40,1</b>
<b>60-69</b>	<b>35,0</b>	<b>36,4</b>

*N Bajos, M Bozon. Enquête sur la sexualité en France. Editions La découverte. Mars 2008.*

**FF-3S**

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE SEXOLOGIE ET DE SANTÉ SEXUELLE

- Nous avons contacté les ministères pour défendre l'importance d'une prise en charge précoce des troubles sexuels

**Intégrer une consultation spécifique dans le parcours de soin**

**Dépense supplémentaire ou économie ? économie !**

# Pourquoi ?

## Réponse en 3 volets

- **Educatif :**
  - l'apprentissage de la sexualité par la pornographie,
- **Santé :**
  - les bénéfices d'une prise en charge adaptée,
- **Sociétal :**
  - le retentissement des troubles sexuels sur le couple et la famille,
  - le lien entre trouble sexuel et la violence sociale.

**Le 1<sup>er</sup> bénéficiaire est pour le patient  
lui-même ....**



# Exemple: la DE diminue la Qualité de Vie

- L'insuffisance érectile est à l'origine d'une importante souffrance chez l'individu qui en est atteint,
- Ces hommes montrent une diminution significative de leurs scores de santé générale, sociale et mentale ainsi qu'une baisse de l'estime de soi et de leur bien être émotionnel alors que leurs scores de dépression augmentent significativement.
- Sur un plan clinique le retentissement se fait dans 3 directions :
  - Dévirilisation,
  - Anxiété de performance,
  - Peur d'être abandonné.

*Litwin MS., et al. Health-related quality of life in men with erectile dysfunction. J. Gen. Intern. Med. 1998 ; 13 : 159-166.*

*Althof, SE. Quality of life and erectile dysfunction. Urology, 2002, 59(6): 803-10.*

*Seidman, SN. Exploring the relationship between depression and erectile dysfunction in aging men. J Clin Psychiatry , 2002, 63 Suppl 5: 5-12; discussion 23-5.*

# Traiter une dysfonction érectile....

- Apporte tout de suite un grand bénéfice à l'homme.
- Avec le retour de l'érection :
  - Réapparition de sa confiance en lui,
  - Disparition de sa peur d'être abandonné,
  - Reprise du dialogue avec sa compagne,
  - Amélioration parfois spectaculaire de son humeur.

# Traiter une dysfonction érectile....

- Apporte donc tout de suite un grand bénéfice à l'homme.
- **Mais qu'en est-il de sa partenaire ?**
  - A-t'elle souffert de la dysfonction érectile de son compagnon ?
  - Voit-elle sa propre sexualité s'améliorer si l'érection de son compagnon va mieux ?



## Sexual function and satisfaction in heterosexual couples when men are administered sildenafil citrate (Viagra®) for erectile dysfunction: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

JR Heiman,<sup>a</sup> DR Talley,<sup>b</sup> JL Bailen,<sup>c</sup> TA Oskin,<sup>d</sup> SJ Rosenberg,<sup>a</sup> CR Pace,<sup>f</sup> DL Creanga,<sup>g</sup>  
T Bavendam<sup>f</sup>

BJOG 2007;114:437–447.

## Improving the Sexual Quality of Life of Couples Affected by Erectile Dysfunction: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Vardenafil

William A. Fisher, PhD,<sup>\*</sup> Raymond C. Rosen, PhD,<sup>†</sup> Martin Mollen, MD,<sup>‡</sup> Gerald Brock, MD,<sup>§</sup>  
Gary Karlin, MD,<sup>¶</sup> Peter Pommerville, MD,<sup>¶</sup> Irwin Goldstein, MD,<sup>\*\*</sup> Keith Bangerter, PhD,<sup>††</sup>  
Tiemo-Joerg Bandel, MD,<sup>‡‡</sup> Leonard R. Derogatis, PhD,<sup>§§</sup> and Michael Sand, RN, MPH<sup>††</sup> for the  
Vardenafil Study Group

J Sex Med 2005;2:699–708

1314

### ORIGINAL RESEARCH—COUPLES' SEXUAL DYSFUNCTIONS

## Impact on Erectile Function and Sexual Quality of Life of Couples: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Tadalafil Taken Once Daily

Eusebio Rubio-Aurioles, MD, PhD,<sup>\*</sup> Edward D. Kim, MD,<sup>†</sup> Raymond C. Rosen, PhD,<sup>‡</sup>  
Harmut Porst, MD,<sup>§</sup> Patrick Burns, PharmD,<sup>¶</sup> Haoyue Zeigler, MS,<sup>¶</sup> and David G. Wong, MD<sup>¶</sup>

J Sex Med 2009;6:1314–1323

# **Prendre en charge un Patient souffrant de Dysfonction Érectile: un vrai service à lui rendre ?**


**Le 1<sup>er</sup> bénéfice est pour le patient,**

**Le 2<sup>ème</sup> bénéfice est pour son partenaire,**

**Y a-t-il d'autres bénéfices ?**

- La survenue d'un troubles sexuel peut conduire les patients à interrompre un traitement médical, pourtant utile ...

« Avez-vous arrêté le traitement parce que vous aviez le sentiment qu'il vous causait des problèmes d'érection ? »



- La survenue d'un troubles sexuel peut être un facteur précipitant vers l'addiction ...

Sexual dysfunction prior to first drug use among former drug addicts and its possible causal meaning on drug addiction : preliminary results. La Pera G, Carderi A, Marianantoni Z, Persi F, Lentini M, Taggi F. J Sex Med 2008 Jan,5(1):164-172.

- La survenue d'un troubles sexuel peut être un facteur précipitant vers la dépression ...

Presse Med. 2014; 43: 1111-1115  
© 2014 Elsevier Masson SAS  
Tous droits réservés.

en ligne sur / en lire en  
www.sciencedirect.com/journal  
www.sciencedirect.com

TROUBLES DE LA SEXUALITÉ ET MALADIES CHRONIQUES

Dossier thématique

Mise au point



Dépression et sexualité

Robert Porto

## Dépression et sexualité : de la comorbidité à l'interaction

- dépression résultant d'une DS : le stress psycho-relacionnel et social induit par une DE peut causer une dépression chez un sujet vulnérable ;

- Il existe indiscutablement des liens entre « *troubles* » sexuels et le suicide ... notamment chez l'adolescent

Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: findings from the Adverse Childhood Experience Study. Dube SR, Anda RF, Felitti VJ, Chapman DP, Williamson DF, Giles WH. JAMA 2001 Dec 26;286(24):3089-3096.

Suicide ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual and transgender youth. Liu RT, Mutanski B. Am J Prev Med 2012 Mar;42(3):221-228.

# Et il y a encore d'autres bénéfices à considérer ?

- La survenue d'une dysfonction érectile n'est pas toujours seulement un symptôme sexuel ....

Exemple: plus de 30 % des patients ayant une DE ignorent leur problème de santé sous-jacent et les prendre en charge s'inscrit dans une véritable démarche de médecine préventive.

*Speel, T. G., H. van Langen and E. J. Meuleman (2003). "The risk of coronary heart disease in men with erectile dysfunction." Eur Urol 44(3): 366-70; discussion 370-1.*


*Guirao Sanchez L et al. Atencion Primaria, 2002 ; 30 (5) : 290-296*

*Kim SW et al. Potential predictors of asymptomatic ischemic heart disease in patients with vasculogenic erectile dysfunction. Urology. 2001, 58(3): 441-5.*





# La dysfonction érectile : un dénominateur commun avec les maladies CV, la dysfonction endothéliale



## The assessment of vascular risk in men with erectile dysfunction: the role of the cardiologist and general physician

G. Jackson,<sup>1</sup> A. Nehra,<sup>2</sup> M. Miner,<sup>3</sup> K. L. Billups,<sup>4,5</sup> A. L. Burnett,<sup>6</sup> J. Buvat,<sup>7</sup> C. C. Carson,<sup>8</sup> G. Cunningham,<sup>9</sup> I. Goldstein,<sup>10</sup> A. T. Guay,<sup>11</sup> G. Hackett,<sup>12</sup> R. A. Kloner,<sup>13</sup> J. B. Kostis,<sup>14</sup> P. Montorsi,<sup>15</sup> M. Ramsey,<sup>16</sup> R. Rosen,<sup>17</sup> R. Sadowsky,<sup>18</sup> A. D. Seftel,<sup>19</sup> R. Shabsigh,<sup>20</sup> C. Vlachopoulos,<sup>21</sup> F. C. W. Wu<sup>22</sup>

together, these data suggest that ED is an independent marker of generalised ischaemic CVD and that a 1-year window of opportunity exists for modifying cardiovascular events in these men.

### Message for the clinic

Erectile dysfunction is an independent marker of increased CVD risk, particularly in younger and middle-aged men. A cardiologist or other clinician with relevant expertise plays an important role in evaluating this risk in men with ED, who may have subclinical CVD. Increased recognition of the potential for CVD in men with ED, followed by appropriate preventive or corrective action, can improve and may save lives.

# Le thérapeute encore


Certainement ! En p  
risques qu'il cour  
traitement

leParisien.fr

avec leParisien  
**ECONOMIE**  
A la une  
Immobilier  
Emploi  
Votre argent  
Retraites  
Bourse

## Saisie géante de médicaments contrefaits vendus sur internet

Publié le 29.09.2011, 14h33 | Mise à jour : 14h46



Coup de filet mondial sur les médicaments contrefaits. Les services de police et des douanes de 81 pays ont saisi 2,4 millions de doses de médicaments d'une valeur de 6,3 millions de dollars (4,6 millions d'euros), lors d'une opération menée en une semaine, a annoncé jeudi Interpol. Les produits, contrefaits, sont vendus sur internet.

Au cours de cette opération intitulée, «Pangea 4», les policiers ont interpellé 55 personnes, selon un communiqué de l'organisation de police internationale basée à Lyon.

En France, les douanes ont annoncé avoir saisi plus de 109 700 médicaments de contrebande dont plus de 90 000 à Roissy, dans un communiqué conjoint avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Plus de la moitié des saisies en France concernent des spécialités traitant des troubles de l'érection.

En outre, 46 sites internet illicites localisés en France ont été fermés, et 13 485 au total dans les pays participants. L'opération Pangea, menée pour la quatrième année consécutive, a pour objectif d'attirer l'attention du public sur les risques pour la santé à acheter des médicaments en ligne.

LeParisien.fr

Droits de reproduction et de diffusion réservés - Copyright LE PARISIEN 2011

# Un danger pour la santé publique

- ❑ Les médicaments contrefaits peuvent contenir des ingrédients nocifs, comme de la mort-aux-rats, de l'acide borique et de la peinture au plomb<sup>7,8</sup>
  - ❑ Ils peuvent contenir une dose trop élevée ou trop faible de principe actif, voire ne pas contenir du tout de principe actif<sup>4,9</sup>
  - ❑ Ils peuvent entraîner des échecs thérapeutiques, voire la mort<sup>9</sup>
  - ❑ Ils sont généralement fabriqués par des personnes ne disposant pas des compétences requises, dans des conditions d'hygiène non garanties<sup>10,11</sup>

## Sources:

4. Fiche d'information OMS. Counterfeit medicines. Dernière révision 14 novembre 2006. Dernier accès novembre 2009
7. Solomon, S. BC Woman killed by fake drugs bought online. National Review of Medicine. 2007; 4:13
8. Données internes Pfizer
9. Fiche d'information OMS et IMPACT. Counterfeit drugs kill! Dernier accès novembre 2009
10. European Alliance for Access to Safe Medicines: The Counterfeiting Superhighway, 2008, Medicom
11. Données internes Pfizer

# Des conditions de fabrication insalubres...





## Journée de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et promotion de la santé sexuelle

# FF-3S

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE SEXOLOGIE ET DE SANTÉ SEXUELLE

[www.ff3s.fr](http://www.ff3s.fr)

### 14h45 Session 1 : Le cadre conceptuel de la santé sexuelle

*Modérée par Pr François Dabis* (HCSP - Haut conseil de la santé publique)

- Approche médicale en santé sexuelle (Pr Pierre Costa)

